

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES


Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**



PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICH NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)



AC

(51) Internationale Patentklassifikation 6: C12N 15/18, C07K 14/475, 16/22, C12N 5/10, A61K 38/22, 48/00, G01N 33/53, C12Q 1/68		A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/22000 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 6. Mai 1999 (06.05.99)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE98/03155 (22) Internationales Anmeldedatum: 27. Oktober 1998 (27.10.98)		(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).	
(30) Prioritätsdaten: 197 47 418.7 27. Oktober 1997 (27.10.97) DE		Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i>	
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten außer US): DEUTSCHE KREBSFORSCHUNGSZENTRUM STIFTUNG DES ÖFFENTLICHEN RECHTS (DE/DE); Im Neuenheimer Feld 280, D-69120 Heidelberg (DE).			
(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): NIEHRS, Christof [DE/DE]; Klingenteichstrasse 6b, D-69117 Heidelberg (DE). GLINKA, Andrei [RU/DE]; Erlenweg 22, D-69126 Heidelberg (DE).			
(74) Anwalt: HUBER, Bernard; Truderinger Strasse 246, D-81825 München (DE).			
(54) Title: INHIBITOR PROTEIN OF THE WNT SIGNAL PATHWAY			
(54) Bezeichnung: INHIBITOR-PROTEIN DES WNT-SIGNALWEGS			
(57) Abstract <p>An inhibitor protein of the wnt signal pathway, a DNA coding for such a protein and a process for preparing such a protein are disclosed, as well as the use of the DNA and protein and antibodies against said protein.</p>			
(57) Zusammenfassung <p>Die vorliegende Erfindung betrifft ein Inhibitor-Protein des wnt-Signalwegs, eine ein solches Protein kodierende DNA und ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Proteins. Ferner betrifft die Erfindung die Verwendung der DNA und des Proteins sowie gegen das Protein gerichtete Antikörper.</p>			

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	S威士忌
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Moskau	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Grünenland	ML	Mail	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Beckin	IE	Irland	MQ	Mauritanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Iceland	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NB	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estonien						

Inhibitor-Protein des wnt-Signalwegs

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Inhibitor-Protein des wnt-Signalwegs, eine ein solches Protein kodierende DNA und ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Proteins. Ferner betrifft die Erfindung die Verwendung der DNA und des Proteins sowie gegen das Protein gerichtete Antikörper.

5

Der wnt-Signalweg spielt eine wichtige Rolle in der Regulation der Zellproliferation und -Differenzierung während der Embryonal-Entwicklung von Drosophila, Xenopus laevis und der Maus. Der wnt-Signalweg umfaßt die Kombination von sekretorischen Glykoproteinen, die durch wnt-Gene, z.B. Xwnt-8, kodiert sind, und wnt-Rezeptoren, an die die Glykoproteine binden. Ferner ist der wnt-Signalweg beim Menschen kausal im Colon- und Mammakarzinom sowie dem Melanom impliziert (vgl. Peifer, M., Science 275, (1997), 1752-1753). Inhibitoren des wnt-Signalwegs könnten daher eine Möglichkeit darstellen, therapeutisch bei Tumorerkrankungen eingreifen zu können.

15

Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, ein Mittel bereitzustellen, mit dem der wnt-Signalweg inhibiert werden kann.

20

Erfindungsgemäß wird dies durch die Gegenstände in den Patentansprüchen erreicht.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist somit ein Inhibitor-Protein des wnt-Signalwegs, wobei das Protein zumindest eine der in Fig. 1 angegebenen Aminosäure-Konsensus-Sequenzen I und II umfaßt.

25

Die vorliegende Erfindung beruht auf der Erkenntnis des Anmelders, daß in Tieren, besonders Säugetieren, ganz besonders dem Menschen, ein Protein existiert, das den wnt-Signalweg inhibiert. Der Anmelder hat gefunden, daß die

- 2 -

Expression des wnt-Gens, Xwnt-8, in *Xenopus laevis* zur Ausbildung von Siamesischen Zwillingen führt. Diese Mißbildung wird verhindert, wenn gleichzeitig das vorstehende Protein exprimiert wird. Dieses Protein ist ein sekretorisches Protein von etwa 40 kD. Es weist zumindest eine der in Fig. 1 angegebenen Cysteinreichen Aminosäure-Konsensus-Sequenzen I und II auf. Varianten des Proteins sind in Form ihrer DNAs in Fig. 2 angegeben. Des Weiteren hat der Anmelder erkannt, daß Varianten des Proteins in unterschiedlichen Geweben exprimiert werden (vgl. Tabelle 1 und Fig. 3).

10 In der vorliegenden Erfindung wird vorstehendes Protein mit "wnt-Inhibitor" (wnt-I) bezeichnet.

In bevorzugter Ausführungsform weist (wnt-I) die in Fig. 1 angegebenen Aminosäure-Konsensus-Sequenzen I und II auf.

15 Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine für (wnt-I) kodierende Nukleinsäure. Diese kann eine RNA oder eine DNA sein. Letztere kann z.B. eine genomische DNA oder eine cDNA sein. Bevorzugt ist eine DNA, die folgendes umfaßt:

20 (a) die DNA von Fig. 2 oder eine hiervon durch ein oder mehrere Basenpaare unterschiedliche DNA,

(b) eine mit der DNA von (a) hybridisierende DNA, oder

25 (c) eine mit der DNA von (a) oder (b) über den degenerierten genetischen Code verwandte DNA.

Der Ausdruck "hybridisierende DNA" weist auf eine DNA hin, die unter üblichen Bedingungen, insbesondere bei 20°C unter dem Schmelzpunkt der DNA, mit einer DNA von (a) hybridisiert.

- 3 -

Die DNA von Fig. 2 umfaßt sieben DNAs, die aus *Xenopus laevis*, Maus, Mensch oder Huhn stammen und für (wnt-l) kodieren. Sechs dieser DNAs wurden bei der DSMZ (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen) am 19. Sept. 1997 wie folgt hinterlegt:

5

- Fig. 2.1 (DNA aus Mensch) als phdkk-3 unter DSM 11762
- Fig. 2.2 (DNA aus Huhn) trägt die Bezeichnung pcdkk-3
- Fig. 2.3 (DNA aus Maus) als pmdkk-2 unter DSM 11759
- Fig. 2.4 (DNA aus Mensch) als phdkk-2 unter DSM 11761
- 10 Fig. 2.5 (DNA aus Maus) als pmdkk-1 unter DMS 11758
- Fig. 2.6 (DNA aus Mensch) als phdkk-1 unter DSM 11760
- Fig. 2.7 (DNA aus *Xenopus laevis*) als pRNdkk-1 unter DSM 11757

Nachstehend wird eine erfindungsgemäße DNA in Form einer cDNA beschrieben.

15 Diese steht beispielhaft für jede unter die vorliegende Erfindung fallende DNA.

Zur Herstellung einer erfindungsgemäßen cDNA ist es günstig, von einer *Xenopus laevis*-cDNA-Bibliothek auszugehen (vgl. Glinka, A. et al., Mechanisms Develop. 60, (1996), 221-231). Von den einzelnen cDNA-Klonen werden mittels RNA-Polymerase entsprechende mRNAs synthetisiert. Diese werden zusammen mit mRNA von wnt-Genen, z.B. Xwnt-8, in *Xenopus laevis* mikroinjiziert. Es wird auf die Ausbildung von Siamesischen Zwillingen bei *Xenopus laevis* gescreent. Diese werden erhalten, wenn die mRNA des wnt-Gens alleine oder zusammen mit solcher *Xenopus laevis* mRNA mikroinjiziert wird, die nicht für (wnt-l) kodiert. Das Nicht-Auftreten von Siamesischen Zwillingen wird somit als Nachweis für das Vorliegen einer mRNA gewertet, die für (wnt-l) kodiert. Solch eine mRNA läßt unmittelbar die entsprechende cDNA erkennen.

Eine erfindungsgemäße cDNA kann in einem Vektor bzw. Expressionsvektor vorliegen. Beispiele solcher sind dem Fachmann bekannt. Im Falle eines Expressionsvektors für *E. coli* sind dies z.B. pGEMEX, pUC-Derivate, pGEX-2T, pET3b und pQE-8. Für die Expression in Hefe sind z.B. pY100 und Ycpad1 zu

- 4 -

nennen, während für die Expression in tierischen Zellen z.B. pKCR, pEFBOS, cDM8 und pCEV4, anzugeben sind. Für die Expression in Insektenzellen eignet sich besonders der Baculovirus-Expressionsvektor pAcSGHisNT-A.

5 Der Fachmann kennt geeignete Zellen, um eine, erfindungsgemäß, in einem Expressionsvektor vorliegende cDNA zu exprimieren. Beispiele solcher Zellen umfassen die E.coli-Stämme HB101, DH1, x1776, JM101, JM 109, BL21 und SG 13009, den Hefe-Stamm *Saccharomyces cerevisiae* und die tierischen Zellen L, 3T3, FM3A, CHO, COS, Vero und HeLa sowie die Insektenzellen sf9.

10 Der Fachmann weiß, in welcher Weise eine erfindungsgemäß cDNA in einen Expressionsvektor inseriert werden muß. Ihm ist auch bekannt, daß diese cDNA in Verbindung mit einer für ein anderes Protein bzw. Peptid kodierenden DNA inseriert werden kann, so daß die erfindungsgemäß cDNA in Form eines Fusionsproteins exprimiert werden kann.

15 Des weiteren kennt der Fachmann Bedingungen, transformierte bzw. transfierte Zellen zu kultivieren. Auch sind ihm Verfahren bekannt, das durch die erfindungsgemäß cDNA exprimierte Protein zu isolieren und zu reinigen. Ein solches Protein, das auch ein Fusionsprotein sein kann, ist somit ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfindung.

20 Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein gegen ein vorstehendes Protein bzw. Fusionsprotein gerichteter Antikörper. Ein solcher Antikörper kann durch übliche Verfahren hergestellt werden. Er kann polyklonal bzw. monoklonal sein. Zu seiner Herstellung ist es günstig, Tiere, insbesondere Kaninchen oder Hühner für einen polyklonalen und Mäuse für einen monoklonalen Antikörper, mit einem vorstehenden (Fusions)protein oder Fragmenten davon zu immunisieren. Weitere "Booster" der Tiere können mit dem gleichen (Fusions)protein oder Fragmenten davon erfolgen. Der polyklonale Antikörper kann dann aus dem Serum bzw. Eigelb der Tiere erhalten werden. Für den monoklonalen Antikörper werden Milzzellen der Tiere mit Myelomzellen fusioniert.

- 5 -

Die vorliegende Erfindung ermöglicht es, den wnt-Signalweg besser zu untersuchen und zu verstehen. Mit einem erfindungsgemäßen Antikörper kann (wnt-I) in Organismen nachgewiesen werden. Ferner kann mit einem erfindungsgemäßen (wnt-I) ein gegen dieses Protein gerichteter Autoantikörper nachgewiesen werden. Beide Nachweise können durch übliche Verfahren, insbesondere einen Western Blot, einen ELISA, eine Immunpräzipitation oder durch Immunfluoreszenz, erfolgen. Des Weiteren kann mit einer erfindungsgemäßen Nukleinsäure, insbesondere einer DNA und hiervon abgeleiteten Primern, die Expression des für (wnt-I) kodierenden Gens nachgewiesen werden. Dieser Nachweis kann in üblicher Weise, insbesondere in einem Southern Blot, erfolgen.

Somit können mit der vorliegenden Erfindung auch Prozesse besser untersucht, d.h. diagnostiziert, und verstanden werden, die mit dem wnt-Signalweg zusammenhängen. Dies sind z.B. Zellproliferation und -Differenzierung sowie Erkrankungen verschiedenster Art. Beispiele von letzteren sind Erkrankungen des Auges und der Knochen sowie Tumorerkrankungen, insbesondere Colon- und Mammakarzinom sowie Melanom.

Des Weiteren eignet sich die vorliegende Erfindung, Maßnahmen für und gegen das Vorliegen von (wnt-I) in Organismen zu ergreifen. Mit einem erfindungsgemäßen Antikörper kann (wnt-I) in Organismen inhibiert werden. Andererseits kann mit einem erfindungsgemäßen (wnt-I), insbesondere nach Kopplung an ein vom Körper nicht als fremd angesehenes Protein, z.B. Transferrin oder BSA, die Menge von (wnt-I) in Organismen erhöht werden. Entsprechendes kann auch mit einer erfindungsgemäßen Nukleinsäure, insbesondere einer DNA, erreicht werden, die unter die Kontrolle eines in bestimmten Geweben induzierbaren Promotors gestellt wird und nach ihrer Expression zur Bereitstellung von (wnt-I) in diesen Geweben führt. Darüberhinaus kann eine erfindungsgemäße Nukleinsäure, insbesondere eine DNA, auch zur Inhibierung von (wnt-I) genutzt werden. Hierzu wird die Nukleinsäure, z.B. als Basis für die Erstellung von Anti-Sinn-Oligonukleotiden zur Expressions-Inhibierung des für (wnt-I) kodierenden Gens verwendet.

- 6 -

Somit stellt die vorliegende Erfindung auch die Möglichkeit bereit, in den wnt-Signalweg aktivierend bzw. inhibierend einzutreten. Erstes könnte z.B. durch Verabreichung eines erfindungsgemäßen Antikörpers gegen (wnt-I) erfolgen. Für letzteres bietet sich an, erfindungsgemäßes (wnt-I) zu verabreichen. Die Aktivierung des wnt-Signalwegs könnte sinnvoll sein, wenn daran gedacht wird, Organismen für Organspende zu züchten. Die Inhibierung des wnt-Signalwegs bietet sich allerdings an, um therapeutisch bei Erkrankungen von Knochen und des Auges sowie bei Tumorerkrankungen, insbesondere Colon- und Mammakarzinomen sowie Melanom, eingreifen zu können.

10

Insbesondere zeichnet sich die vorliegende Erfindung dadurch aus, daß sie gewebespezifisch eingesetzt werden kann. Dies gilt sowohl für Diagnose als auch für Therapie. Beispielsweise eignet sich eine erfindungsgemäße DNA, DKK-1, ein entsprechendes Protein bzw. ein Antikörper davon besonders für Gewebe, wie Gehirn, Herz, Gefäße, Knochen, Knorpel, Bindegewebe und Auge. Ferner eignet sich eine erfindungsgemäße DNA, DKK-2, ein entsprechendes Protein bzw. ein Antikörper davon besonders für Gewebe, wie Gehirn, Herz, Gefäße, Knochen, Bindegewebe, Nieren, Hoden, Milz, Ovarien, Muskel, Uterus, Knorpel, Auge und Brustdrüse. Des Weiteren eignet sich eine erfindungsgemäße DNA, DKK-3, ein entsprechendes Protein bzw. ein Antikörper davon, besonders für Gewebe, wie Gehirn, Herz, Gefäße, Knochen, Knorpel, Auge, Bindegewebe, Lunge, Ovarien, Muskel und Brustdrüse.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen:

25

Fig. 1 zeigt die Aminosäure-Konsensus-Sequenzen I und II eines erfindungsgemäßen (wnt-I). Die Angabe "-" bedeutet eine Aminosäure, wobei die Zahl der Aminosäuren variabel ist, wenn sie einen Stern aufweisen,

30

Fig. 2 zeigt die Basensequenz von sieben (wnt-I) kodierenden DNAs mit Angabe der Basen, die zu den Aminosäure-Konsensus-Sequenzen

- 7 -

von (wnt-I) beitragen.

Fig. 3 zeigt die Expression von drei (wnt-I) kodierenden DNAs, DKK-1, DKK-2 und DKK-3, in Geweben.

5

Die vorliegende Erfindung wird durch die nachstehenden Beispiele erläutert.

Beispiel 1: Herstellung und Reinigung eines erfindungsgemäßen (wnt-I)

Zur Herstellung eines erfindungsgemäßen (wnt-I) wurde die DNA von Fig. 2.6, 10 phdkk-1 mit Bam HI-Linkern versehen, anschließend mit Bam HI gespalten und in den mit Bam HI gespaltenen Expressionsvektors pQE-8 (Qiagen) inseriert. Es wurde das Expressionsplasmid pQ/wnt-I erhalten. Ein solches kodiert für ein Fusionsprotein aus 6 Histidin-Resten (N-Terminuspartner) und einem erfindungsgemäßen (wnt-I) (C-Terminuspartner). pQ/wnt-I wurde zur Transformation von 15 E.coli SG 13009(vgl. Gottesman, S. et al., J. Bacteriol. 148, (1981), 265-273) verwendet. Die Bakterien wurden in einem LB-Medium mit 100 μ g/ml Ampicillin und 25 μ g/ml Kanamycin kultiviert und 4 h mit 60 μ M Isopropyl- β -D-Thiogalactopyranosid (IPTG) induziert. Durch Zugabe von 6 M Guanidinhydrochlorid wurde eine Lyse der Bakterien erreicht, anschließend wurde mit dem Lysat eine Chromatographie (Ni-NTA-Resin) in Gegenwart von 8 M Harnstoff entsprechend der 20 Angaben des Herstellers (Diagen) des Chromatographie-Materials durchgeführt. Das gebundene Fusionsprotein wurde in einem Puffer mit pH 3,5 eluiert. Nach seiner Neutralisierung wurde das Fusionsprotein einer 18 % SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese unterworfen und mit Coomassie-Blau angefärbt (vgl. Thomas, 25 J.O. und Kornberg, R.D., J.Mol.Biol. 149 (1975), 709-733).

Es zeigte sich, daß ein erfindungsgemäßes (Fusions)protein in hochreiner Form hergestellt werden kann.

30 **Beispiel 2: Herstellung und Nachweis eines erfindungsgemäßen Antikörpers**
Ein erfindungsgemäßes Fusionsprotein von Beispiel 1 wurde einer 18 % SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese unterzogen. Nach Anfärbung des Gels mit 4 M

- 8 -

Natriumacetat wurde eine ca. 40 kD Bande aus dem Gel herausgeschnitten und in Phosphat gepufferter Kochsalzlösung inkubiert. Gel-Stücke wurden sedimentiert, bevor die Proteinkonzentration des Überstandes durch eine SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese, der eine Coomassie-Blau-Färbung folgte, bestimmt wurde. Mit dem Gel-gereinigten Fusionsprotein wurden Tiere wie folgt immunisiert:

Immunisierungsprotokoll für polyklonale Antikörper im Kaninchen

Pro Immunisierung wurden 35 μ g Gel-gereinigtes Fusionsprotein in 0,7 ml PBS und 0,7 ml komplettem bzw. inkomplettem Freund's Adjuvans eingesetzt.

Tag 0: 1. Immunisierung (komplettes Freund's Adjuvans)

Tag 14: 2. Immunisierung (inkomplettes Freund's Adjuvans; icFA)

Tag 28: 3. Immunisierung (icFA)

Tag 56: 4. Immunisierung (icFA)

15 Tag 80: Ausbluten

Das Serum des Kaninchens wurde im Immunoblot getestet. Hierzu wurde ein erfundungsgemäßes Fusionsprotein von Beispiel 1 einer SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese unterzogen und auf ein Nitrocellulosefilter übertragen (vgl.

20 Khyse-Andersen, J., J. Biochem. Biophys. Meth. 10, (1984), 203-209). Die Western Blot-Analyse wurde wie in Bock, C.-T. et al., Virus Genes 8, (1994), 215-229, beschrieben, durchgeführt. Hierzu wurde das Nitrocellulosefilter eine Stunde bei 37°C mit einem ersten Antikörper inkubiert. Dieser Antikörper war das Serum des Kaninchens (1:10000 in PBS). Nach mehreren Waschschritten mit PBS wurde das Nitrocellulosefilter mit einem zweiten Antikörper inkubiert. Dieser Antikörper war ein mit alkalischer Phosphatase gekoppelter monoklonaler Ziege Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper (Dianova) (1:5000) in PBS. Nach 30-minütiger Inkubation bei 37°C folgten mehrere Waschschritte mit PBS und anschließend die alkalische Phosphatase-Nachweisreaktion mit Entwicklerlösung (36 μ M 5' Bromo-4-chloro-3-indolylphosphat, 400 μ M Nitroblau-tetrazolium, 100mM Tris-HCl, pH 9.5, 100 mM NaCl, 5 mM MgCl₂) bei Raumtemperatur, bis Banden sichtbar waren.

- 9 -

Es zeigte sich, daß erfindungsgemäße, polyklonale Antikörper hergestellt werden können.

Immunisierungsprotokoll für polyklonale Antikörper im Huhn

5 Pro Immunisierung wurden 40 μ g Gel-gereinigtes Fusionsprotein in 0,8 ml PBS und 0,8 ml komplettem bzw. inkomplettem Freund's Adjuvans eingesetzt.

Tag 0: 1. Immunisierung (komplettes Freund's Adjuvans)

Tag 28: 2. Immunisierung (inkomplettes Freund's Adjuvans; icFA)

10 Tag 50: 3. Immunisierung (icFA)

Aus Eigelb wurden Antikörper extrahiert und im Western Blot getestet. Es wurden erfindungsgemäße, polyklonale Antikörper nachgewiesen.

15 **Immunisierungsprotokoll für monoklonale Antikörper der Maus**

Pro Immunisierung wurden 12 μ g Gel-gereinigtes Fusionsprotein in 0,25 ml PBS und 0,25 ml komplettem bzw. inkomplettem Freund's Adjuvans eingesetzt; bei der 4. Immunisierung war das Fusionsprotein in 0,5 ml (ohne Adjuvans) gelöst.

20 Tag 0: 1. Immunisierung (komplettes Freund's Adjuvans)

Tag 28: 2. Immunisierung (inkomplettes Freund's Adjuvans; icFA)

Tag 56: 3. Immunisierung (icFA)

Tag 84: 4. Immunisierung (PBS)

Tag 87: Fusion

25

Überstände von Hybridomen wurden im Western Blot getestet. Erfindungsgemäße, monoklonale Antikörper wurden nachgewiesen.

30

Tabelle 1: Expression von erfundungsgemäßen DNAs in Mausembryonen

	Dkk-1	Dkk-2	Dkk-3
Neuroepithelium			
E9.5 diencephalon	+++ ventral	+++ medial	+ medial
E12.5	telencephalon M/mantle	hypothalamus	telencephalon M/ventricular zone
Eye	pigmented epithelium	choroid	retina
Spinal cord	-/+	-	ventricular zone Roof plate
Mesoderm:			
Heart E10	bulbus cordis Endocardium septum transversum	endothelium	myocardium
Heart E12	endocardial cushion	endothelium	endocardial cushion
Blood vessels	+++ aorta	+++ pulmonary artery	+++ aorta + pulmonary artery
Limb bud mesenchyme	E9 S	I	D
Bone E12	perichondrium	S/mesenchyme	perichondrium mesenchyme

- 11 -

Bone E 15	Ossification centers	
Urogenital	nephric duct S-shaped body	<i>metanephric mesenchyme</i>
	Comma shaped body	
Palate	+++	++
Hair follicle	+++ mesenchyme + epithelium	+
Tooth mesenchyme	-	-
Trunk mesoderm	+/-	+++

Legende: Mesoderm: (D) deep, (I) intermediate (L) lateral, (M) medial, (S) superficial.
 Expressionstypic: (-) absence, (+/-) very weak expression, (+) medium, (++) strong, (+++) very strong.

- 12 -

Patentansprüche

- 5 1. Inhibitor-Protein des wnt-Signalwegs, wobei das Protein zumindest eine der in Fig. 1 angegebenen Aminosäure-Konsensus-Sequenzen I und II umfaßt.
- 10 2. Protein nach Anspruch 1, wobei das Protein die Aminosäure-Konsensus-Sequenzen I und II umfaßt.
- 15 3. DNA, kodierend für das Protein nach Anspruch 1 oder 2.
4. DNA nach Anspruch 3, wobei die DNA umfaßt:
 - (a) die DNA von Fig. 2 oder eine hiervon durch ein oder mehrere Basenpaare unterschiedliche DNA,
 - (b) eine mit der DNA von (a) hybridisierende DNA oder
 - (c) eine mit der DNA von (a) oder (b) über den degenerierten genetischen Code verwandte DNA.
- 20 5. Expressionsplasmid, umfassend die DNA nach Anspruch 3 oder 4.
- 25 6. Transformante, enthaltend das Expressionsplasmid nach Anspruch 5.
7. Verfahren zur Herstellung des Proteins nach Anspruch 1 oder 2, umfassend die Kultivierung der Transformante nach Anspruch 6 unter geeigneten Bedingungen.
- 30 8. Antikörper, gerichtet gegen das Protein nach Anspruch 1 oder 2.
9. Verwendung des Proteins nach Anspruch 1 oder 2 als Reagens zur Diagnose und/oder Therapie.

- 13 -

10. Verwendung der DNA nach Anspruch 3 oder 4 als Reagens zur Diagnose und/oder Therapie.

1/11




Fig. 1

iii. 2

3/11

Fig. 2 (Forts.)

312	CIGCTAACGATCAGAAGGAACTTACCTTCCAGCTTACAAAGA	phdtk-5
244	GCGCAAAACTGAGAAGTAAACCTTGGAAACTTACCTTCCAG	pcdk-3
106	GCACAGGCCCT	pmdk-2
67	GGCACAGGCCCT	phdtk-2
329	GTCTCAGCCCCAGCGGGCAGCCGGCGGAGGAGGTTA	pmdk-1
314	GGCTAGCCCCA.CCCCCTGGGGAGGGGACCCGCGGCTG	phdtk-1
361	GGCTAGCCCCA	pmNdk-1
372	CCGAAACAGACACGAGGGTGGAAATTCATGTCCTGAAAT	phdtk-3
304	CCMAGACGAAACGAGATGGGAAATTCATGTCCTGAAAT	pcdk-3
140	GGAGGAAAGAAAGGAAGGAAATTCATGTCCTGAAAT	pmdk-2
109	GGAGAAGAAAGGAAGGAAATTCATGTCCTGAAAT	phdtk-2
309	GAAGAGGAGGAAATTCATGTCCTGAAAT	pmdk-1
371	GGAGGAGGAAATTCATGTCCTGAAAT	phdtk-1
406	GGAGGAGGAAATTCATGTCCTGAAAT	pmNdk-1
432	TATGAGAAACGAAACGAGACAAATACAACTTAAGG	phdtk-3
364	TATGAGAAACGAAACGAGACAAATACAACTTAAGG	pcdk-3
200	ATGGATAATGGGGATGGGGATGGGGATGGGGATGGGG	pmdk-2
169	ATGGATAATGGGGATGGGGATGGGGATGGGGATGGGG	phdtk-2
449	ATGGATAATGGGGATGGGGATGGGGATGGGGATGGGG	pmdk-1
431	ATGGATAATGGGGATGGGGATGGGGATGGGGATGGGG	phdtk-1
466	ATGGGGATGGGGATGGGGATGGGGATGGGGATGGGG	pmNdk-1

Fig. 2 (Forl.s.)

5/11

433	616	GAGAAGAAACAAAGAAACATGAGCTTCAAGTGAAACAGTGAAACAGTGAAAGT	phdtk-3
	265	CCCCATAGAAACGGCAACCGGGCATAGAAACGGCAACCGGGCATAGAAACGGCAAC	pcdk-3
	226	GGTACTGGCACAGGAACGGAAACCACTGGTAAACCTGGTAAACCTGGTAAACCTGG	pmdk-2
	500	GGAAACATTTAACCTGGTAAACCTGGTAAACCTGGTAAACCTGGTAAACCTGGTAAAC	phdtk-2
	170	GGAAACATGGTAAACCTGGTAAACCTGGTAAACCTGGTAAACCTGGTAAACCTGGTAAAC	pmdk-1
	525	GGAAACATGGTAAACCTGGTAAACCTGGTAAACCTGGTAAACCTGGTAAACCTGGTAAAC	phdtk-1
		GGAAACATGGTAAACCTGGTAAACCTGGTAAACCTGGTAAACCTGGTAAACCTGGTAAAC	phdtk-1
433	484	AUCCGAGTCACCTGGAAUACAUUACAUUACAUUACAUUACAUUACAUUACAUUACAUU	phdtk-3
	325	ACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUAC	pcdk-3
	206	ACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUAC	pmdk-2
	560	ACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUAC	phdtk-2
	533	ACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUAC	pmdk-1
	503	ACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUAC	phdtk-1
		ACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACUAC	phdtk-1
433	514	GCTCAAGGAAUUCGGGAUACCAAGCTTGGTGGTGGTGGTGGTGGTGGTGGTGGTGGT	phdtk-3
	385	GGCAAGGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCA	pcdk-3
	346	GGCAAGGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCA	pmdk-2
	620	GGCAAGGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCA	phdtk-2
	593	GGCAAGGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCA	pmdk-1
	643	GGCAAGGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCA	phdtk-1
		GGCAAGGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCAUACGCA	phdtk-1

Fig. 2 (Forts.)

433	CCACTTCAAGATGTTACCA	phdtk-3
604	GGAAACCAAGTCCTTGT	pcdk-3
445	TCTGCCATGCCATGCCAT	phdtk-2
406	TCTGCCATGCCATGCCAT	phdtk-2
600	TCTGCCATGCCATGCCAT	phdtk-1
653	TCTGCCATGCCATGCCAT	phdtk-1
703	TCTGCCATGCCATGCCAT	pRNAtk-1
433	ATGTTCTTCTTCTTCTTCT	phdtk-3
663	ATGGAAATGGAAATGGAA	pcdk-3
505	ATGGAAATGGAAATGGAA	phdtk-2
466	ATGGAAATGGAAATGGAA	phdtk-2
740	ACGGGCCTTACGGGCCTT	phdtk-1
713	ATGGAAATGGAAATGGAA	phdtk-1
763	ATGGAAATGGAAATGGAA	pRNAtk-1
433	GGTGAACCTGGCAAGATCT	phdtk-3
723	GGTGAACCTGGCAAGATCT	pcdk-3
565	AAGATGCCACCTACTTCA	phdtk-2
526	AAGATGCCACCTACTTCA	phdtk-2
800	AAGATGCCACCTACTTCA	phdtk-1
773	AAGATGCCACCTACTTCA	phdtk-1
823	AAGATGCCACCTACTTCA	pRNAtk-1

Fig. 2 (Forts.)

7/11

433	CCTGATGGAGTACCTAGAGGCCGCCATTGGCAAGTGAACTGGCTTGAACTGGC	phdak-3
703	GAAGAGTCATCACTAGAGACCTGGAGACCTGGAAATGGCAAGTGAACTGGC	phdak-3
619	GAAGACTGAACTGGAGACATCACTAGAGACCTGGAAATGGCAAGTGAACTGGC	phdak-2
530	CAACATTGGAGAACATCACTAGAGACCTGGAAATGGCAAGTGAACTGGC	phdak-2
556	... ACCGACAGIC.. . AAAAATGATGGACCTTTATCTAAATAGCCACGAAAAT	phdak-1
829		phdak-1
8003	C6A66CC1ACAGAG.. . CC1G1AAG6ACCT1C1C1AA1A1A1A1A1A1A1A1	phdak-1

435		phdA-k-3
4893	AGCCACGIACTACATCIGIGIGAACCTGCCCCATGAAACCAGAA	phdA-k-3
670	AAGAAGGAAACCTGGATTGGAAAGCGGAAGAAAGGGAGGGAA	phdA-k-2
6840	AAGGAGGAAAGAAAGGTGAGATGCAAGAAAGATGGCTAAAGA	phdA-k-2
910	CTTAAAGATLIGCAGCTAACTCCAAAGGATGAGGAACCTTCAGT	phdA-k-1
029		phdA-k-1
3941	CIGCAAGIATTTCTAGTTTACAGAAGGCTCTGGCTTCCCCTGAA	phdA-k-1

Fig. 2 (Forts.)

8/11

433	phdtk-3
963	C T G A T T A C C G A A A G C A G G C I C A T I C A G G A A G T G C G I A A A G A A I T A G A A A G C C I G G A G	pcdk-3
798	T T A T G I G C C I C A T C I A G T A A A T A A T G T A C A C A T T T G I G A A A A T G C I A A T A A A A G A A	phdtk-2
757	G T G A G G G T T A A T	phdtk-2
1030	C T G I G A T T G C A G T A A A I I A C T G T G T G I A A A T C C C I C A G T G T G G C A C I T A C C I G I A A A T G C	pcdk-1
829	phdtk-1
1061	I G T T G I A A A I A C I A C G C A A G G A G C C I G T A A A A A C T G I A A A I A C C C G I A Y A A A G I G	phdtk-1

433		phdtk-3
1023	GACCAAGCAGGTGIGAAGTCATGCCATGGCTACCTATTCCTGGAGATGA	phdtk-3
850	AGCACACCAAGAAATTACAAA	phdtk-2
769		phdtk-2
1090	A9CAAACCTTTAAATATTTCTTAAGAGTGTGTCATTTGCCCTGCTGCTG	phdtk-1
829		phdtk-1
1121	TACATGACTCTCTATGIAACCTGCCACCTTGACATCCGACGGCTCTCTT	phdtk-1

433	ATAGAAGTCAACCCAGTTAGCTTGGCTAGAAATTGTTGCTAGTGTCCTA	phdtk-3
1083	pcdkk-3
1082	pmdkk-2
769	phdtk-2
1150	GAACTTCTTGTCTGCTGCTGCTAGATGCTACAAATACTAAATGAGTAGAGV	pdtk-1
829	phdtk-1
101	TAT	prndtk-1

Fig. 2 (cont'd.).

9/11

Fig. 2 (cont'd.)

10/11

433		phdtk-3
1323	C T T G T A C A G G C A A T T A A C C T T A C G T A C T C G T A C T C A T T A A A A A C A C A C G G A G C A	pCdtk-3
802	pmddk-2
769	phdtk-2
1227	pmddk-1
829	phdtk-1
1290	pRNdtk-1
433		phdtk-3
1303	T	pCdtk-3
882	..	pmddk-2
769	..	phdtk-2
1227	..	pmddk-1
829	..	phdtk-1
1290	..	pRNdtk-1

Fig. 2 (conts.)

11/11




Fig. 3

SEQUENZPROTOKOLL

(1) ALLGEMEINE ANGABEN:

(i) ANMELDER:

(A) NAME: Deutsches Krebsforschungszentrum
 (B) STRASSE: Im Neuenheimer Feld 280
 (C) ORT: Heidelberg
 (E) LAND: Deutschland
 (F) POSTLEITZAHL: 69120

(ii) BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG: Inhibitorprotein des wnt-Signalwegs

(iii) ANZAHL DER SEQUENZEN: 7

(iv) COMPUTER-LESBARE FASSUNG:

(A) DATENTRÄGER: Floppy disk
 (B) COMPUTER: IBM PC compatible
 (C) BETRIEBSSYSTEM: PC-DOS/MS-DOS
 (D) SOFTWARE: PatentIn Release #1.C, Version #1.30(EPA)

(v) DATEN DER VORANMELDUNG:

ANMELDENUMMER: DE 19747416.7

(2) ANGABEN ZU SEQ ID NO: 1:

(i) SEQUENZKENNZEICHEN:

(A) LÄNGE: 1297 Basenpaare
 (B) ART: Nucleotid
 (C) STRANGFORM: Einzelstrang
 (D) TOPOLOGIE: linear

(ii) ART DES MOLEKÜLS: Genom-DNA

(iii) HYPOTHETISCH: NEIN

(iv) ANTISENSE: NEIN

(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 1:

GACAGTCGGAA	GCCGGCGCTG	CAGCATCAA	GGGACTTATC	TTGGAGGA	TGTGAATTCT	60
CATCCTCCA	TTGTGGTTAC	TGAGTCCTGG	TGGACAGAGG	AATGGGCAGC	AACATGTTCC	120
CGGTGCCCTCT	TATTGTCTTT	TGGGGTTTTA	TCTTGGATGG	GGCACTTGGC	TTTGTATGA	180
TGACCAACTC	CAACTCCATC	AAGAATGTGC	CGGGGGCACC	AGCAGGTCA	CCCATTGGCT	240
ACTACCTGT	GAGCGTCAGT	CCGGACTCCC	TATATGATAT	TGCCAACAA	TACCAACCTC	300
TGGATGCCATA	CCCCCTCTAC	AGTTGCACGG	AAGATGATGA	CTGTGCCCTT	GATGAATTCT	360
GTCACTTTC	CAGAAACGGC	AACTCTCTGG	TTTGCTTGGC	ATGCCGGAAA	CCGAGAAAGC	420
GTGCGCTGAG	GGACGCCATG	TGCTGCACAG	CGCAACTACTG	TAGCAACGGA	ATTGTGTCC	480
CTGTGGAGCA	AGATCAAGAG	CGCTTCCAAC	ACCAGGGATA	CCTGGAAGAA	ACCATTCTGG	540
AAAATCTATAA	TAATGCTGAT	CATGCAACAA	TGGATACTCA	TTCCAAATTAA	ACCACGTCCC	600

2

CATCTGGAAT	GCAGCCCTTT	AAAGGCCGTG	ATGGTGATGT	TTGCCTCCGA	TCAACTGACT	660
GTGCGCCAGG	TCTATGCTGT	GCCCCTCATT	TCTGGTCAAA	GATCTGCAAG	CCGGTCCCTTG	720
ATGAAAGCCA	AGTGTGCACC	AAGCACAGGA	GGAAAGGCTC	TCACCGGCTA	GAGATTTCC	780
AGCCTTGTCA	CTGCGGTGCC	GGACTCTCGT	CCCGGTTACA	GAAAGGAGAA	TTTACAACTG	840
TCCCTAAAAC	ATCGAGACTT	CACACTGCC	AAAGACACTA	AGCGAGGGCT	ACAGAGCCTG	900
AAGGACCTTC	TCTAAATTAA	GCTAAATTAG	ACTTTGGTAC	CTGCATGTTA	TTTCTCAGT	960
TTACATGAAG	TGCTCTGGTC	TTCCCTGAAC	CCGGAAAGCTG	CGCAACTTGT	TTCTTTTTTT	1020
SAGGAACCTTC	CTAATTAAATG	CTAATTACAG	TAAATTACTG	TGTTGAAAT	ACTACGCAAG	1080
SAGACCTGTA	AAAACGTAA	ATACCCGTGT	ATAGAAAGTG	TACATGATCT	TCTCTATTGT	1140
AACCTGCCAC	CTTGTACATT	CCGACGCGCT	CTTCCCTTTT	TATATATATA	TATATATAAA	1200
TATATATTAT	ATTATGTAGA	GTTTACGTCT	AGTATGTCTG	TATTTTAAT	TGAAATAAAA	1260
CATTTCTAAA	CTTAAAAAAC	AAAAAAAAAA	AAAAAAA			1297

(2) ANGABEN ZU SEQ ID NO: 2:

- (i) SEQUENZKENNZEICHEN:
 (A) LÄNGE: 881 Basenpaare
 (B) ART: Nucleotid
 (C) STRANGFORM: Einzelstrang
 (D) TOPOLOGIE: linear

(ii) ART DES MOLEKÜLS: Genom-DNA

(iii) HYPOTHETISCH: NEIN

(iv) ANTISENSE: NEIN

(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 2:

TGCAGGCATG	AACAAGGACT	GGGTTGGCG	GCAGTGAGAA	GGGCAAAAGC	CTGGGGCAGG	60
CCTACCCCTTG	CAGCAGTGAT	AAGGAATGTG	AAGTTGGAAG	ATACTGCCAC	AGTCCCCACC	120
AAGGTTCATC	AGCCTGCATG	CTCTGTAGGA	GGAAAAAGAA	ACGATGCCAC	AGAGATGGGA	180
TGTGTGCCC	TGGTACCCGC	TGCAATAATG	GAATCTGCAT	CCCACTCACT	GAGAGCATCC	240
TCACCCACA	TATCCAGCT	CTGGATGGCA	CCCGGCATAG	AGATCGAAC	CATGGTCACT	300
ATTCCAACCA	TGACCTGGGA	TGGCAGAAC	TAGGAAGGCC	ACACTCCAAG	ATGCCTCATA	360
TAAAAGGACA	TGAAGGAGAC	CCATGCCTAC	GGTCATCAGA	CTGCATTGAT	GGGTTTTGTT	420
GTGCTGCCA	CTTCTGGACC	AAAATCTGCA	AACCAGTGCT	CCATCAGGGG	GAAGTCTGTA	480
CGAACACAG	CGAGAAGGGT	TCGCACGGGC	TGGAGATTT	CCAGAGGTGT	GACTGTGCAA	540
AGGGCCTGTC	CTGCAAAGTG	TGGAAAGATG	CCACCTACTC	TTCCAAAGCC	AGACTCCATG	600
TATGCCAGAA	GATCTGATAA	ACACTGGAAG	AGTCATCACT	AGCAGACTGT	GAATTGTGT	660

3

ATTTAATGCA TTATGGCATG ATGGAAACCT GGATTGGAAT GCGGAAGAAC GAGGGATGTG	720
GTAAGAATGT GGAGCAGAAC AGGGCAGGAC TGAATCAAGT AGAGTCGACA ACAACCAAAG	780
TACTACCACT GTTCCGTTA TGTGCCTCAT CTATGTAAT AATGTACACA TTTGTAAAAA	840
TGCTTATTATT AAAAGAAAAGC ACACCATGGA AATTACAAAAA A	881

(2) ANGABEN ZU SEQ ID NO: 3:

- (i) SEQUENZKENNZEICHEN:
 (A) LÄNGE: 1225 Basenpaare
 (B) ART: Nucleotid
 (C) STRANFORM: Einzelstrang
 (D) TOPOLOGIE: linear

(ii) ART DES MOLEKÜLS: Genom-DNA

(iii) HYPOTHETISCH: NEIN

(iv) ANTISENSE: NEIN

(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 3:

GACCCACCGG TCCGTGCGTG TTTGCGTCCT CGGAGATGA TGGTTGTGTG TGCACCGGCA	60
GCTGTCGGT TCTTGGCCGT GTTTACAATG ATGGCTCTCT GCAGCCTCCC TCTGCTAGGA	120
GCCAGTGCCTA CCTTGAACTC AGTTCTCATC AATTCCAACG CGATCAAGAA CCTGCCCGCA	180
CCGCTGGGTG GTGCTGGGGG GCAGCCGGGC TCTGCTGTCA GTGTGGCGCC GGGAGTTCTC	240
TATGAGGGCG GAAACAAGTA CCAGACTCTT GACAACCTACC AGCCCTACCC TTGCGCTGAA	300
CATGAGGGAGT GCGGCTCTGA CGAGTACTGC TCCAGCCCCA GCGCGGGGGC AGCCGGCGTC	360
GGAGGTGTAC AGATCTGTCT GGCTTGCGCA AAGCGCAGGA AGCGCTGCAT GACGCACGCT	420
ATGTGCTGCC CGGGAACTA CTGAAAAAT GGAATATGCA TGCCCTCTGA CCACAGCCAT	480
TTTCCTCGAG GGGAAATTGA GGAAAGCATT ATTGAAAACC TTGTTAATGA CCACAACGCC	540
GGCGCGGGGG ATGGATATCC CAGAAGAAC ACCACTGACTT CAAAAATATA TCACACCAAA	600
GGACAAAGG GCTCCGTCTG CCTCCGATCA TCAGACTGTG CGCGAGGCT GTGTTGTGCA	660
AGACACTCTT GGTCCAAGAT CTGAAACCT GTCCCTAAAG AAGGTCAAGT GTGCACCAAG	720
CACAAACGGA AAGGCTCCC CGGGCTGGAG ATATTCCAGC GCTGTTACTG CGGGGAAGGC	780
CTGGCTTGCA GGATACAGAA AGATCACCAT CAAGCCAGCA ATTGTTCTAG GCTCCACACC	840
TGCCAGAGAC ACTAAACCGA CAGTCTAAAT ATGATGGACT CTTTTTATCT AATATATGCT	900
ACGAAAATCC TTTATGATTG TGTAGCTCAA TCCCAAGGAT GTAGGAATCT TCAGTGTGTA	960
ATTAAGCATT CGGACAATAC TTTCCAAAAG CTCTGGAGTG TAAGGACTTT GTTCTTGTAT	1020
GGAACTCCCC TGTGATTGCA GTAAATTACT GTGTTGTAA TCCCTAGTGT GGCACATTAC	1080
TGTAAATGCA GCAAAACTTT TAATTATTTT TCTAGAGGTG TGGTACATTG CCTTGTGTTCT	1140

CTTGCATGTA AATTTTTTTT GTACACGGTT GATTGTCTTG ACTCATAAAT ATTCTATATT 1200
 CGACTAGAAA AAAAAAAA AAAAAA 1226

(2) ANGABEN ZU SEQ ID NO: 4:

- (i) SEQUENZKENNZEICHEN:
 - (A) LÄNGE: 768 Basenpaare
 - (B) ART: Nucleotid
 - (C) STRANGFORM: Einzelstrang
 - (D) TOPOLOGIE: linear
- (ii) ART DES MOLEKÜLS: Genom-DNA
- (iii) HYPOTHETISCH: NEIN
- (iv) ANTISENSE: NEIN

(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 4:

ATACGACTCA CTATAGGAA TTTGGCCCTC GAGGCCAAGA ATTGGCACG AGGGTTGGGA	60
GGTATTGCCA CAGTCCCCAC CAAGGATCAT CGGCCTGCAT GGTGTGTCGG AGAAAAAAGA	120
AGCGCTGCCA CCCAGATGGC ATGTGCTGCC CCAGTACCCG CTGCAATAAT GGCATCTGTA	180
TCCCAGTTAC TGAAAGCATC TTAACCCCTC ACATCCCGC TCTGGATGGT ACTCGGCACA	240
GAGATCGAAA CCACGGTCAT TACTCAAACC ATGACTTGGG ATGSCAGAAT CTAGGAAGAC	300
CACACACTAA GATGTCACAT ATAAAAGGGC ATGAAGGAGA CCCCTGCCA CGATCATCAG	360
ACTGCATTGA AGGGTTTTGC TGTGCTGTC ATTTCTGGAC CAAAATCTGC AAACCAAGTGC	420
TCCATCAGGG GGAAGTCTGT ACCAAACAAAC GCAAGAAGGG TTCTCATGGG CTGGAAATT	480
TCCAGCGTTG CGACTGTGCG AAGGGCTGT CTTGCAAAGT ATGGAAAGAT GCCACCTACT	540
CCTCCAAAGC CAGACTCCAT GTGTGTCAGA AAATTTGATC ACCATTGAGG AACATCATCA	600
ATTGCAGACT GTGAAGTTGT GTATTTAATG CATTATAGCA TGGTGGAAAA TAAGGTTCA	660
ATGCAGAAGA ATGGCTAAAA TAAGAAACGT GATAAGAATA TAGATGATCA CAAAAAAA	720
AAAAAAAAAG ATGGGGCCGC AAGCTTATTC CCTTGTGA GGGTTAAT	768

(2) ANGABEN ZU SEQ ID NO: 5:

- (i) SEQUENZKENNZEICHEN:
 - (A) LÄNGE: 828 Basenpaare
 - (B) ART: Nucleotid
 - (C) STRANGFORM: Einzelstrang
 - (D) TOPOLOGIE: linear
- (ii) ART DES MOLEKÜLS: Genom-DNA
- (iii) HYPOTHETISCH: NEIN
- (iv) ANTISENSE: NEIN

(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 5:

TGGCCCCCA CGCCAAAAAT TCGGCACGAG GGTCTGGCAC TCAGAGGATG CTCTGACCTT	60
GAAAGGGTCC TATCTGGAGA CGAGGGAGTA CAACGTGCTG AATGTGTGCG GTTCAGGGAG	120
CATTTGGTAA CCCTGCATTG GGGAGCAGTG GGCACTAACC GGTTTGGAG AGGTGGACAC	180
ATAAGGACTG TGATCAGCGC CCGGGTCCAA GAGGGGGGT ACCTGGACCT CTGGGTGCCT	240
CACCCCTCTCC CGAACCCCTT CCCACAGCGC TACCCGTGCG CAGAGGACGA GGAGTGGCGC	300
ACTGATGAGT ACTGCGCTAG TCCCACCCCG CGGAGGGGAC CGCCGGCCGT GCAAATCTGT	360
CTCGCTCTCA GGAAGCGCCG AAAACGCTGC ATGCCTCACG CTATGTGCTG CCCCCGGAAAT	420
TACTGCAAAA ATGGAATATG TGTGTCTTCT GATCAAATC ATTTCCGAGG AGAAATTGAG	480
GAAACCACATCA CTGAAAGCTT TGGTAATGAT CATAGCACCT TGGATGGGTA TTCCAGAAGA	540
ACCACACCTGT CTTCAAAAAT GTATCACACC AAAGGACAAG AAGGTTCTGT TTGTCCTCCGG	600
TCATCAGACT GTGCCCTCAGG ATTGTGTTGT GCTAGACACT TCTGGTCCAA GATCTGTAAA	660
CCTGTCTGA AAGAAGGTCA AGTGTGTACC AAGCATAGGA GAAAAGGCTC TCATGGACTA	720
GAAATATTCC AGCCTTGTAA CTGTGGAGAA GGTCTGTCTT GCCGGATACA GAAAGATCAC	780
CATCAAGCCA GTAATTCTTC TAGGCTTCAC ACTTGTCAAGA GACACTAA	828

(2) ANGABEN ZU SEQ ID NO: 6:

- (i) SEQUENZKENNZEICHEN:
 - (A) LÄNGE: 432 Basenpaare
 - (B) ART: Nucleotid
 - (C) STRANGFORM: Einzelstrang
 - (D) TOPOLOGIE: linear
- (ii) ART DES MOLEKÜLS: Genom-DNA
- (iii) HYPOTHETISCH: NEIN
- (iv) ANTISENSE: NEIN

(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 6:

CGGGTGGCGG CGCCTCTAGA ATAGTGGATC CCCCCGGCTG CAGGAATTG 3CACGAGCGG	60
CTGCGGGCAG AGAGCGGAGA TGCAAGCGCT TGGGCCACCC TGCTGTGCGT 3CTGCTGGCG	120
CGGGCGGTCC CCACGGCCCC CGCGCCCGCT CCGACGGCGA CCTCGGTCC AGTCAGCCC	180
GGCCCGGCTC TCAGCTACCC GCAGGAGGAG GCCACCTCA ATGAGATGTT CCGCGGGTGA	240
GGAACGTGATG GAGGACACGC AGCACAAATT GCAGCGCG GTGGAAGAGA TGGAGGCAGA	300
AGAAGCTGCT GCTAAAGCAA TCATCAGAAG TGAACCTGGC AAACCTACCT CCCAGCTATC	360
ACAATGAGAC CAACACAGAC ACGAAGGTTG GAAATAATAA CCATCCATGT 3CACCGAGAA	420
ATTCAACAGT TT	432

(2) ANGABEN ZU SEQ ID NO: 7:

(i) SEQUENZKENNZEICHEN:
 (A) LANGE: 1383 Basenpaare
 (B) ART: Nucleotid
 (C) STRANGFORM: Einzelstrang
 (D) TOPOLOGIE: linear

(ii) ART DES MOLEKÜLS: Genom-DNA

(iii) HYPOTHETISCH: NEIN

(iv) ANTISENSE: NEIN

(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 7:

CGGGAGCGG CAGCGGCGGC TGAGGAGCGC CGGGATGCG GCGGGAGAG GGACCGGCGC	60
CGCGCGGCG ATGGCTGCTG CTGTTGGCG TGCTGGCGC TCTGTGCTGC CGCGCGGCCG	120
GGAGCGGCGG CGGGCGGCGA GCGGCCAGCC TGGCGAGAT GCTGCGGGAG GTGGAGGCC	180
TGATGGAGGA CACCGAGCAC AAGCTGCGCA ACGCCGTGCA GGAGATGGAA GCTGAAGAAC	240
AAGGGCAAA AAAACTGTCA GAAGTAAACT TTGAAAACCT ACCTCCCACC TACCATATG	300
AGTCCAACAC AGAAACCAGA ATTGGTAATA AAACGTTCAG GACTCATCAA GAAATTGATA	360
AGGTTACAGA TAACAGAACT GGATCAACAA TTTTTCCGA GACAATTATT ACATCTATAA	420
AGGGTGGAGA AAACAAAAGA AATCATGAGT GTATCATTGA TGAAGACTGT GAAACAGGAA	480
AGTATTGCCA GTTCTCCACC TTTGAATACA AGTGTCAAGCC CTGTAACAC CAGCATAACAC	540
ACTGCTACG AGATGTTGAA TGCTGCGGAG ACCAGCTTTCG TGTGTTGGGT GAGTGCAGGA	600
AAGCCACTTC AAGAGGAGAA AATGGTACCA TTTGTGAGAA CCAACATGAC TGCAACCCAG	660
GAACGTGCTG TGCTTTTCAG AAAGAACTGC TGTGTTCTGT GTGCACTCCG TTACCCGAAG	720
AAGGTGAACC TTGCCATGAT CCTTCAAACA GACTTCTCAA CCTGATCACC TGGGAACCTGG	780
AACCTGATGG AGTACTAGAG CGCTGCCCAT GTGCAAGTGG CTTGATCTGC CAACCTCAGA	840
GCAGCCACAG TACTACATCT GTGTGTGAAAC TGTCTCCAA TGAAACCCAGG AAAAACGAAA	900
AAGAAGATCC CTTGAACATG GATGAGATGC CATTATCAG TTTAATACCC AGAGATATTC	960
TTTCTGATTA CGAAGAAAGC AGCGTCATTC AGGAAGTGC TAAAGAATTA CAAAGCCTGG	1020
AGGACCAAGC AGGTGTGAAG TCTGAGCATG ACCCGGCTCA TGACTTATTT CTGGGAGATG	1080
AAATATGAAG TTCAAACACC AGTTTAGTTA GTCTAGAAA TTGTTGCTA GTGTCTTGCT	1140
TACATACACC CTTAACAGAT ACTGCTGGAT AGAAGTGC TAAACATCTT CATTGAGCAT	1200
CCGTTTCTGT GCACCAAACC TGATGTTCA AATTCTATTT GAATTCACTC AATCTTTGGA	1260
CCAAACTTC CATCAAAGAC AAATGAGAAA CGCATCACTG TTTCTTTGG ATTAATCCTT	1320
TCCTTTCTAC ACCAGAAATA AACGTATCAG TACTCGTACT CATTAAAAAA ACACACGGAG	1380

WO 99/22000

7

PCT/DE98/03155

CAT

1393

ERSATZBLATT (REGEL 20)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/DE 98/03155

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER					
IPC 6 C12N15/18 C07K14/475 C07K16/22 C12N5/10 A61K38/22 A61K48/00 G01N33/53 C1201/68					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS SEARCHED					
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 6 C07K C12N					
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched					
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)					
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages				Relevant to claim No.
X	SAWADA K ET AL: "Characterization of terminally differentiated cell state by categorizing cDNA clones derived from chicken lens fibers." INT J DEV BIOL, JUN 1996, 40 (3) P531-5. XP002096086 SPAIN see the whole document -& EMVRT DATABASE Accession number D26311 29-JUL-1994 (Rel. 40, Created) Sawada K XP002096089 see the whole document --- -/-/				3,4
X					3,4
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of box C. <input type="checkbox"/> Patent family members are listed in annex.					
* Special categories of cited documents : 'A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance 'E' earlier document but published on or after the International filing date 'L' document which may throw doubts on priority, claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) 'O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means 'P' document published prior to the International filing date but later than the priority date claimed					
'T' later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention 'X' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone 'Y' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art 'B' document member of the same patent family					
Date of the actual completion of the international search			Date of mailing of the international search report		
10 March 1999			23/03/1999		
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5015 Patentlaan 2 NL - 2280 MV Rijswijk Tel: (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl Fax: (+31-70) 340-3016			Authorized officer Gurdjian, D		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.
PCT/DE 98/03155

C (Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	GLINKA A ET AL: "Head induction by simultaneous repression of Bmp and Wnt signalling in Xenopus." NATURE, OCT 2 1997, 389 (6650) P517-9, XP002096087 ENGLAND see the whole document -----	1-10
P,X	GLINKA, ANDREI ET AL: "Dickkopf-1 is a member of a new family of secreted proteins and functions in head induction" NATURE (LONDON) (1998), 391(6665), 357-362 CODEN: NATUAS;ISSN: 0028-0836, XP002096088 see the whole document -----	1-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORTInternational application No.
PCT/DE 98/03155**Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)**

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

Remark: Although claims 9, 10 relate to a method for treating the human/animal body insofar as they relate to an in vivo method, the search was carried out and was based on the cited effects of the compound/composition.
2. Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest
 No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

--	--	--

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE 98/03155

A. KLASSEIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES		
IPK 6 C12N15/18 C07K14/475 C07K16/22 C12N5/10 A61K38/22 A61K48/00 G01N33/53 C12Q1/68		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE		
Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 6 C07K C12N		
Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	SAWADA K ET AL: "Characterization of terminally differentiated cell state by categorizing cDNA clones derived from chicken lens fibers." INT J DEV BIOL, JUN 1996, 40 (3) P531-5, XP002096086 SPAIN siehe das ganze Dokument -& EMVRT DATABASE Accession number D26311 29-JUL-1994 (Rel. 40, Created) Sawada K XP002096089 siehe das ganze Dokument -----	3,4
X	-----	3,4
<input checked="" type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen		<input type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besondere Bedeutung anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgetauscht) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist		
"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht identisch, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzipia oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "V" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder erfindensmächer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "W" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindensmächer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahelegend ist "S" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche		Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
10. März 1999		23/03/1999
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel: (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Gurdjian, O

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern	tales Aktenzeichen
PCT/DE 98/03155	

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	GLINKA A ET AL: "Head induction by simultaneous repression of Bmp and Wnt signalling in <i>Xenopus</i> ." NATURE, OCT 2 1997, 389 (6650) P517-9, XP002096087 ENGLAND siehe das ganze Dokument -----	1-10
P, X	GLINKA, ANDREI ET AL: "Dickkopf-1 is a member of a new family of secreted proteins and functions in head induction" NATURE (LONDON) (1998), 391(6665), 357-362 CODEN: NATUAS; ISSN: 0028-0836, XP002096088 siehe das ganze Dokument -----	1-10

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 98/03155

Feld I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:

1. Ansprüche Nr. weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich
Bemerkung: Obwohl die Ansprüche 9,10, insoweit bezogen auf ein in Vivo Verfahren sich auf ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen/tierischen Körpers beziehen, wurde die Recherche durchgeführt und gründete sich auf die angeführten Wirkungen der Verbindung/Zusammensetzung.
2. Ansprüche Nr. weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
3. Ansprüche Nr. weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.

Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

1. Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.
2. Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.
4. Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt:

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs

- Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.
 Die Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

